



Grandes Cultures

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n° 23 du 3 juillet 2007 - 1 page

Actualité

Les récoltes d'escourgeon et de colza restent perturbées par les pluies. Démarrage des récoltes de lin et des premiers blés.

MAIS : 8 feuilles à sortie des soies.

TOURNESOL : floraison.

Maladies betteraves

Comme annoncé la semaine dernière, les maladies de la betterave s'installent très tôt. Seul l'oïdium est encore rare.

La **cercosporiose** est surtout présente dans la moitié sud de la région (ex Méréville, Courdimanche / Essonne (91) Jaulnes, Pécly, Garentreville, Egreville, Marolles sur Seine (77)....).

La **ramulariose** est également surtout présente dans le sud Seine et Marne (Egreville, Garentreville, Château Landon) et à Méréville (91).

Présence de **rouille** dans différents secteurs comme à Haravilliers, Marly la ville, Vigny (95), Nangis, Brie Comte Robert, Egreville, Marolles sur Seine (77) Méréville (91).....

Les seuils d'intervention sont souvent atteints pour l'une ou l'autre des maladies :

- 10% de feuilles touchées par la rouille,
- ou 5% de feuilles touchées par la cercosporiose ou la ramulariose.

Ravageurs betteraves

Des chenilles de **teigne** sont toujours observées dans le centre Seine et Marne (Pécly, Jaulnes) sur 5 à 15% des pieds.

Présence de **noctuelles** (5 à 20% des pieds) par exemple à Etrepilly, Nangis, Marolles sur Seine, Egreville (77), Guigneville / Essonne et Courdimanche / Essonne (91).

Rappel des seuils d'intervention :

- 10% de plantes porteuses de teignes,
- 50% de plantes porteuses de chenilles, ou morsures pour les noctuelles.

Ravageurs du maïs

Pyräle

Les captures se maintiennent à un niveau élevé dans la plupart des sites (voir graphique). On détecte de plus en plus aisément des pontes,

comme par exemple à :

- Chaumes en Brie et Varredes (77) sur 5% des pieds,

- Jaulnes (77) sur 10% des pieds,

- Saint Jean les Deux Jumeaux (77) sur 20% des pieds.

A Château Landon (77) où le vol avait démarré tôt, on trouve des chenilles au 2ème stade larvaire.

Dès que les conditions le permettront, terminez rapidement les traitements anti-pyräle nécessaires.

Pucerons

En dépit des conditions météorologiques, on note une évolution inquiétante des infestations de pucerons, notamment de *Rhopalosiphum padi* (puceron vert-olive à gris, avec arrière abdomen rougeâtre). Quelques dizaines de pucerons par plante sont ainsi observés au Mesnil Aubry (95), à Saint Jean les Deux Jumeaux, Varredes, Criseno, Château Landon (77) avec une présence sur 10% des panicules environ.

Il convient de surveiller l'évolution de ces populations, surtout si les températures remontent. Ces attaques peuvent être préjudiciables en cas de pullulation durant la floraison : développement de fumagine qui réduit la photosynthèse, perturbation de la fécondation et avortements. Des attaques importantes avaient été observées dans les années 80, suite aux traitements anti-pyräles sous forme liquide.


Le seuil d'intervention est de 50% des panicules touchées, avec des produits autorisés à base de pyrimicarbe.

Betteraves
Protection fongicide.

Teigne à surveiller.

Maïs
Vigilance pucerons.

Captures moyennes de pyräle
réseau SPV - FREDON - CAIF



Direction Régionale et Interdépartementale de l'Agriculture et de la Forêt

Service Régional de la Protection des Végétaux
ILE DE FRANCE

10 rue du séminaire
94516 RUNGIS cedex
Tél : 01-41-73-48-00
Fax : 01-41-73-48-48

Bulletin réalisé avec la participation de la FREDON Ile de France

Imprimé à la station D'Avvertissements Agricoles de Rungis
Directeur gérant : N. THERRE

Publication périodique C.P.P.A.P.
n°0909 B 07113
ISSN n°0767-5542

Tarifs individuels 2007:
80 euros (papier)
72 euros (fax)
66 euros (mail)

4°50-48244 23

P138